



RVP

Nieuws



rijksvaccinatieprogramma

10 september 2009

NR.7

Nieuwe Influenza A (H1N1) en RVP-vaccinaties

De aankomende griep пандemie kan invloed hebben op de uitvoering van het RVP, bijvoorbeeld door ziekte van CB-medewerkers of JGZ-medewerkers van de GGD. Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM heeft de minister van VWS een advies gestuurd voor als deze situatie zich voordoet. Dat advies luidt: vaccinaties van baby's (DKTP-Hib(-HepB) + Pneu en BMR + MenC) gaan in principe zonder uitstel door; vaccinaties van 4-jarigen (DKTP) en schoolgaande kinderen (BMR + DTP) kunnen eventueel worden uitgesteld, bijvoorbeeld met een halfjaar.

Vooralsnog blijft het huidige RVP van kracht. Een tijdelijk aangepast RVP wordt pas ingevoerd, nadat het ministerie van VWS daartoe besloten heeft. VWS zal dit doen op advies van een speciaal deskundigenteam dat snel bij elkaar kan komen, mocht dat nodig zijn. Indien aanpassing van het RVP aan de orde is, dan wordt dit tijdig gecommuniceerd via RVP Nieuws. De bovengegeven informatie is uitsluitend bedoeld voor de uitwerking van interne continuïteitsplannen ter voorbereiding van een griep epidemie.

Nieuwe Influenza A (H1N1): overige maatregelen

Verschillende maatregelen kunnen het verspreiden van Nieuwe Influenza A helpen voorkomen. Hieronder een opsomming van maatregelen en richtlijnen voor het consultatiebureau.

- Neem de hygiënemaatregelen (hoest- en handhygiëne) in acht op het CB. Dat wil zeggen: na elk consult handen wassen.
- Ouders die bellen dat zij of hun kind klachten hebben die kunnen wijzen op de griep moeten thuis blijven. Iemand die koorts (38 °C of hoger) en luchtwegklachten zoals hoesten heeft, kan besmet zijn met het nieuwe griepvirus.
- Kinderen (en ouders) die op het CB verschijnen met griepverschijnselen moeten naar huis. Iemand die koorts (38 °C of hoger) en luchtwegklachten zoals hoesten heeft, kan besmet zijn met het nieuwe griepvirus.

Verder kunnen kinderen die Tamiflu gebruiken en verder niet ziek zijn, gewoon gevaccineerd worden. Het aangrijpingspunt van vaccins en antivirale middelen verschilt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het BMR-vaccin.

RVP en HPV-vaccinatie

Vanaf eind augustus zijn de prik sessies voor de derde prik tegen baarmoederhalskanker begonnen. Datum en plaats van de prik sessies verschillen per regio. De sessies kunnen niet gebruikt worden om meisjes die voor de HPV-vaccinatie komen ook hun achterstallige RVP-vaccinaties te geven. HPV-vaccinaties mogen in principe niet met andere vaccinaties op dezelfde dag gegeven worden.