



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

RVP Nieuws

28 juni 2012 | nr 9

Rijksvaccinatieprogramma

In dit nummer

.....
Toename besmettingen kinkhoest
.....

.....
Verzending RVP nieuws geautomatiseerd
.....

Toename besmettingen kinkhoest

Sinds december 2011 is er sprake van een stijging in het aantal gemelde patiënten met kinkhoest. De grootste toename is in de leeftijdscategorieën 0 – 2 maanden en 8 – 15 jaar. Met name de stijging onder de risicogroep zuigelingen baart zorgen, temeer daar er in 2012 twee zuigelingen zijn overleden. Met het oog hierop verzoekt het RIVM de consultatiebureaus met klem de eerste vaccinatie van zuigelingen, conform de RVP-uitvoeringsregels, 6 – 9 weken na de geboorte te geven.

Volg ons:   

Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor niet of onvolledig gevaccineerde zuigelingen. Zuigelingen met kinkhoest moeten vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. De laatste 15 jaar zijn er in Nederland 8 zuigelingen aan kinkhoest overleden. Bij oudere kinderen en volwassenen verloopt de ziekte vaak minder heftig. De typische verschijnselen van kinkhoest komen minder vaak voor, meestal is er alleen sprake van langdurig hoesten. Wel kunnen deze oudere patiënten onvolledig gevaccineerde zuigelingen besmetten. In gezinnen met onbeschermd zuigelingen is het daarom belangrijk bij hoestklachten van gezinsleden de huisarts te raadplegen.

Vaccinatie tegen kinkhoest

Binnen het Rijksvaccinatieprogramma krijgen alle zuigelingen een uitnodiging voor vaccinatie tegen kinkhoest (DKTP-Hib-HepB). De vaccinatie bestaat uit een serie prikken waardoor de bescherming opgebouwd wordt. Elke vaccinatie draagt bij aan bescherming en na 3 vaccinaties zijn kinderen beschermd tegen kinkhoest. De vervolgvaccinaties (11 maanden en 4 jaar) zorgen voor een langere bescherming. Vanwege de verheffing van kinkhoest is het nu extra belangrijk om de eerste vaccinatie van zuigelingen bij de consultatiebureaus tijdig in te plannen.

De eerste vaccinatie geeft al bescherming

Ook al is de bescherming na één vaccinatie nog niet volledig, deze eerste vaccinatie is van groot belang. Uit het **BINKI-onderzoek** bleek dat baby's met kinkhoest die al één

vaccinatie toegediend kregen gemiddeld 7 dagen korter in het ziekenhuis lagen dan baby's met kinkhoest die nog geen vaccinatie gehad hadden. Ook bleek uit **onderzoek** dat bij 40% van de baby's ernstige complicaties zouden zijn voorkomen als vaccinatie gestart was op de leeftijd van 6 weken.


Wat betekent dit voor het consultatiebureau?

De eerste vaccinatie dient gegeven te worden als de baby 6 tot 9 weken oud is. Al langer bestaat het beleid dat in geval van een lokale uitbraak van kinkhoest of een direct kinkhoestcontact de 1e


vaccinatie vanaf de leeftijd van 4 weken gegeven kan worden (zie Uitvoeringsregels RVP hoofdstuk 4.1).

Afhankelijk van de planning op het bureau kan dit dus betekenen dat de 1e vaccinatie soms al tijdens het eerste bezoek op het CB gegeven wordt. Om de ouders hier goed op voor te bereiden kan de verpleegkundige dit tijdens het huisbezoek bespreken.

Het RIVM heeft de informatie over de **kinkhoestverheffing** op haar website geactualiseerd.



Figuur 1: absolute aantal meldingen per maand op basis van melddatum voor 2001, 2004, 2007, 2008, 2011 en 2012 t/m mei



Figuur 2: het leeftijdsspecifieke aantal meldingen op basis van 1ste ziekte dag per 100.000 voor 2001, 2004, 2007, 2008, 2011 en 2012 t/m mei

Geluidsfragment

In het NOS-journaal licht Roel Coutinho de zaken rondom de kinkhoestproblematiek toe. Klik [hier](#) om het fragment te beluisteren.

Verzending RVP Nieuws geautomatiseerd

Met ingang van dit nummer wordt RVP Nieuws voortaan ook automatisch verzonden. Om RVP Nieuws te blijven ontvangen, moet u zich aanmelden via deze [link](#). Deze nieuwe verzendmethode is vooralsnog een aanvulling op de huidige verzendmethode. De huidige methode verdwijnt in de toekomst.

Na het aanmelden ontvangt u per e-mail een bericht dat uw aanmelding is verwerkt. Zodra er een nieuwe RVP Nieuws beschikbaar is, krijgt u deze automatisch toegestuurd.

Waarom deze wijziging?

Door gebruik te maken van een geautomatiseerde database worden abonnees beter en vollediger bereikt. Abonnees kunnen zich gemakkelijker aan- en afmelden. Door gebruik te maken van een automatische module voor de opmaak en verzending kan de nieuwsbrief sneller gemaakt en verstuurd worden. Als RVP Nieuws geprint wordt, wordt er voortaan minder toner gebruikt. De registratie van uw gegevens is beveiligd.

Dit is een uitgave van:
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
 en Milieu**
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de
 communicatie over het Rijksvaccinatieprogramma
 Contact met redactie: rvpcommunicatie@rivm.nl