



Tijdigheid van vaccineren tegen kinkhoest in Zeeland

Marianne van Winkelhof
Stafarts JGZ, arts M&G i.o.

13 april 2017





Disclosure belangen spreker


Geen (potentiële) belangenverstrengeling



Kinkhoest per maand jaren 2006–2014



Verdeling leeftijd




DKTP-vaccinaties verslagjaar 2016

per pc3, cohort 2013, zuigelingen (basisimmuun op leeftijd van 2 jaar)

Percentage



— provincies



Bron: RIVM

IZB en JGZ

Doel: terugdringen aantal zuigelingen met kinkhoest

1. Bewustwording professionals en (aanstaande) ouders

2. Aanpassing werkproces JGZ

Er zijn kinderen met kinkhoest

Wat moet ik doen?

Houd bij hoesten of niezen je hand of zakdoek voor de mond. Was regelmatig de handen met water en zeep.

De volgende personen kunnen contact met iemand met kinkhoest beter vermijden:

- Baby's die nog niet of gedeeltelijk gevaccineerd zijn tegen kinkhoest
- Zwangeren na 34 weken zwangerschap
- Kinderen met ziekten aan de longen of het hart

Heeft een gezinslid van één van bovenstaande personen kinkhoest, neem dan contact op met de huisarts of verloskundige.




Thuisblijven?


Als een kind met kinkhoest zich goed voelt, kan het gewoon naar school of kindercentrum. Thuisblijven helpt niet om verspreiding van kinkhoest te voorkomen, omdat kinderen al besmettelijk zijn voordat er verschijnselen optreden.



Effecten



Effecten



Kinkhoest per maand jaren 2006–2015

