



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Meningokokken ACWY Vaccinatie

Hoe en wat

Gerre Vermeulen
Medisch adviseur RIVM

MenACWY-vaccinatie | Vasteprikdag 2018



Disclosure belangen Gerre Vermeulen

(potentiële) belangenverstrengeling	Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Geen
• Sponsoring of onderzoeksgeld • Honorarium of andere (financiële) vergoeding • Aandeelhouder • Andere relatie, namelijk ...	Geen

[Nieuws](#)[Regio](#)[Sport](#)[Show](#)[Video](#)[Koken & Eten](#)[Binnenland](#)[Buitenland](#)[Politiek](#)[Economie](#)[Gezond](#)[Bizar](#)[Wetenschap](#)[Auto](#)[Digitaal](#)[Lifestyle](#)[Reizen](#)

Mike (18) werd na nachtje stappen doodziek wakker, stierf binnen etmaal


Na een nacht stappen wordt hij doodziek wakker. Mike geeft over, heeft hoofdpijn en krijgt puntjes op zijn huid. Binnen een etmaal sterft de geliefde UT-student. Verwachting wordt verbijsterend verdriet.

Bert Janssen 08-04-18, 13:57 Laatste update: 18:30



Meningokokken


- Gram-negatieve bacterie met polysaccharidekapsel
- 12 verschillende serotypen
- Asymptotisch dragerschap in keel en neus
Bij 10-20% van de mensen
Meestal kortdurend



hoesten



niezen




zoenen





Dragerschap naar leeftijd






Meningokokkenziekte

Klassiek beeld:

- Plots griepachtig beeld
- Snelle progressie
- Sepsis
- Meningitis


Gevolgen:

- Overlijden (gem. 5-10%)
- Ernstige Restverschijnselen (bij 6%), oa:
 - Hersenschade
 - Doofheid
 - Cognitieve- of gedragsproblemen
 - Amputatie






Meningokokkenziekte 1992-2017






Meningokokkenziekte **W** in NL in 2004-2018



t/m maart 2018



MenW – Leeftijdsverdeling van de ziektegevallen





Meningokokken W ziekte, soms atypisch beloop

RAPID COMMUNICATIONS


Presentation with gastrointestinal symptoms and high case fatality associated with group W meningococcal disease (MenW) in teenagers, England, July 2015 to January 2016

H Campbell ¹, SR Parikh ¹, R Borrow ², E Kaczmarski ², ME Ramsay ¹, SN Ladhani ^{1,3}

Mortaliteit: 14-16 %

Atypische symptomen:

- Gastro-intestinaal
- Keelpijn, Epiglottitis, pneumonie
- Artritis





Schippers past vaccinatie tegen meningokokken aan

Nieuwsbericht | 25-09-2017 | 12:00

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid en Sport heeft op advies van een deskundigenberaad besloten de vaccinatie tegen meningokokken aan te passen. In de loop van 2018 krijgen alle baby's van 14 maanden een vaccinatie die beschermt tegen meningokokken typen A, C, W en Y. Ook jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs ontvangen een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken. Met de keuze voor een combinatievaccin wil de minister de gestage toename van besmettingen met meningokokken type W stoppen. Het aantal infecties is gestegen van gemiddeld vier per jaar in de jaren voor 2015 tot vijftig in 2016 en 47 tot 1 augustus van dit jaar.



Vaccinatie - Wie?

- Kinderen 14 maanden:
MenC → MenACWY vaccinatie
- 14 jarigen (*kalenderjaar waarin je 14 wordt*):
MenACWY vaccinatie

sinds
2002



14 maanden



vanaf
2018



14 maanden



14 jaar





Vaccinatie 13/14 jaar

- Cohorten:
 - In 2018: kinderen geboren tussen 01-05-2004 en 31-12-2004
 - In 2019: alle kinderen geboren in 2005
- Start in periode oktober-november 2018
- In groepsvaccinatiesetting
- Voorbereiding in volle gang
- Landelijke bijeenkomst in juni
- Publiekscampagne wordt ontwikkeld



14 jaar



Vaccinatie 14 maanden

Productwissel:

- Periode 13-26 april (uiterlijk vóór 1 mei)
- MenC wordt vervangen door MenACWY

Vanaf dat moment:

Ieder kind dat voorheen in aanmerking zou komen voor MenC, krijgt MenACWY



14 maanden

Dat zijn dus:

- Kinderen voor hun reguliere vaccinatie rond 14 mnd
- Oudere kinderen die nog geen MenC (of MenACWY)-vacc. kregen
- Ook instromers die nog geen MenC (of MenACWY)-vacc. kregen

Niet kinderen die na 1^e verjaardag al een MenC hebben gehad.



14 maanden



Rijksoverheid
Ministerie van Volksgezondheid,
Wetenschap en Sport

Is voor uw kind een vaccinatie tegen
meningokokken(C) gepland?

Vanaf nu krijgen kinderen een vaccinatie
tegen **meningokokken ACWY**



Poster en flyers voor op het CB

Info op rijksvaccinatieprogramma.nl



Rijksoverheid
Ministerie van Volksgezondheid,
Wetenschap en Sport

Vaccinatie tegen
meningokokken
aangepast



MenACWY-vaccinatie | Vasteprikdag 2018

[Infectieziekten](#) ▾[Vaccinaties](#) ▾[Bijwerkingen](#) ▾[Rijksvaccinatieprogramma](#) ▾[Vragen?](#)[English](#)[Home](#) > [Informatie voor professionals](#) > [Vragen en antwoorden over MenACWY-vaccinatie](#)

Vragen en antwoorden over MenACWY-vaccinatie

In dit onderwerp

[Richtlijn Uitvoering RVP, addendum
MenACWY-vaccinatie](#)[Waarom vaccineren tegen MenACWY?](#)[Indicatie algemeen: welke kinderen
komen in aanmerking?](#)[Kinderen rond de leeftijd van 14
maanden](#)[Oudere kinderen](#)[Advies als kind geen indicatie heeft
voor MenACWY](#)[Productwissel voor 1 mei 2018](#)[Vaccinatietechniek en logistiek](#)[Overige vragen en antwoorden](#)[Poster en flyer MenACWY-vaccinatie](#)

Richtlijn MenACWY en vragen + antwoorden op de professionalswebsite

19. MenACWY-vaccinatie voor kinderen op de leeftijd van 14 maanden

[19.1 Vaccineren tegen meningokokken type W](#)[19.2 Indicatie voor vaccinatie met MenACWY op de leeftijd van 14 maanden](#)[19.3 Indicatie voor vaccinatie met MenACWY op tienerleeftijd](#)[19.4 Contra-indicaties](#)[19.5 Simultaan vaccineren en intervallen](#)[19.6 Vaccin, vaccinatietechniek en werkingsduur](#)[19.7 Effectiviteit](#)[19.8 Veiligheid, ervaring en bijwerkingen](#)[19.9 Inhaalschema voor kinderen geboren op of na 1 juni 2001](#)[19.10 Communicatie, registratie en \(herinnerings\)oproepen](#)[19.11 Bestaande en nieuwe bezwaren](#)[19.12 Belangrijke links en referenties](#)



14 maanden

Vaccinatie **14 mnd.:** het vaccin

- Voorgevulde spuit en flacon met poeder
 - Eerst reconstitueren
 - Geen naald meegeleverd
- Werkingsduur en bijwerkingenprofiel gelijk aan MenC-vaccin
- Ook contra-indicaties en vaccinatietechniek hetzelfde





14 maanden

Vaccinatie **14 mnd.:** registratie vaccinatie

- In DD-JGZ kun je MenACWY registreren
Let op: lotnummer van verpakking / flacon
- Oproepkaarten: MenC-kaart kan gebruikt worden voor MenACWY-vaccinatie (sticker chargenummer + datum toediening)
- Vaccinatiebewijs: Verander MenC in MenACWY, of noteer bij 'overig'

MenC Inentingsdatum	Paraaf
HPV Inentingsdatum	Paraaf
Overig Inentingsdatum	Paraaf



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Vragen?

MenACWY-vaccinatie | Vasteprikdag 2018