



## Детские профилактические прививки

Прививка 1  Прививка 2

3 месяца

АКДС/Полиоувакцина-Хиб-ГепВ

Пневмо



5 месяцев

АКДС/Полиоувакцина-Хиб-ГепВ

Пневмо



11 месяцев

АКДС/Полиоувакцина-Хиб-ГепВ

Пневмо



14 месяцев


ММР

MenACWY (менингококковая вакцина)



4 лет

КДС/Полиоувакцина



9 лет

АДС/Полиоувакцина

Корь/краснуха/  
паротит



10 лет (ревакцинация через полгода)


ВПЧ

ВПЧ



14 лет

MenACWY  
(менингококковая  
вакцина)



**Дополнительная прививка АКДС/Полиоувакцина-Хиб-ГепВ в возрасте 2х месяцев**

Если мать не была привита от коклюша в ходе беременности и в особых ситуациях, ребенок получает дополнительную прививку в возрасте 2х месяцев. Посоветуйтесь с детским врачом.

### Используемые в Нидерландах сокращения

D Дифтерия  
К Коклюш  
Т Столбняк

P Полиомиелит  
Hib Гемофильная палочка типа b  
HepB Гепатит типа B

Pneu Пневмококки  
B Паротит  
M Корь

R Краснуха  
MenACWY Менингококковая вакцина ACWY  
HPV Вирус папилломы человека (ХПЧ)

