



National Institute for Public Health
and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport

Bebęinizi RS virüsüne karşı koruyun

Ulusal Aşılama Programı



RS virüsüne karşı koruma

1 Nisan 2025 tarihinden itibaren doğan bebekler, RS virüsüne karşı iğne olabilir. Bu aşı, bebeğinizi RS virüsünün neden olabileceği ciddi hastalıklara karşı korur. Bebeklere üst bacaklarından aşı yapılır.



Her yıl 1.500 ila 3.000 bebek, RS virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmaktadır.

RS virüsü

RS virüsü, solunum yolu enfeksiyonuna yol açar. Bebekler bu virüs nedeniyle çok ciddi şekilde hastalanabilir. Örneğin nefes darlığı yaşayabilirler veya zatürre geçirebilirler. Bebek ne kadar küçükse, RS nedeniyle ciddi şekilde hastalanma riski o kadar yüksek olur.

İyi koruma

RS virüsü aşısı hızlı ve etkili bir koruma sağlar. Belçika ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinde, bebeklere bu aşı şu anda yapılmaktadır. Bu ülkelerde, RS virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuk sayısı %80 oranında azalmıştır.

Yan etkiler?

Bebeklerde, aşığı olmalarının ardından neredeyse hiç yan etki görülmez. Nadiren de olsa, iğnenin yapıldığı yerde kısa süreli kızarıklık veya şişlik olabilir ya da bebeklerde deri döküntüsü görülebilir.

İğne nasıl etki eder?

RS virüsüne karşı yapılan enjeksiyon bir aşı değil, antikor içeren bir iğnedir. Bu iğne, aşıdan farklı şekilde etki eder. Aşılama durumunda vücudun antikorları kendisinin üretmesi gerekir. Bu durum yan etkilere yol açabilir. Zaten içinde antikorların bulunduğu bir iğnede ise vücudun bunları artık kendisinin üretmesine gerek kalmaz. Bu yüzden neredeyse hiç yan etki görülmez.

Doğru mevsimde koruma

İğne yaklaşık altı ay boyunca koruma sağlar. RS virüsü özellikle sonbahar ve kış aylarında görülür. Bu nedenle, bebeğinizin doğduğu mevsim, iğnenin ne zaman yapılacağını belirler. Bu sayede bebeğiniz, doğru mevsimde korunmuş olur.

Ne sıklıkla?

Bebeğiniz bu iğneyi yalnızca 1 kez ve sadece ilk yaşam yılında olur.

Bir an önce

En küçük yaştaki bebekler, RS virüsünün neden olduğu ağır hastalıklara karşı en hassas gruptur. Bu nedenle iğne, sonbahar ve kış aylarında doğan bebeklere doğumdan sonra en kısa sürede yapılır. Böylece bebeğiniz, RS virüsünün en yaygın olduğu dönemde korunmuş olur. 'Bebeğinize iğne ne zaman yapılır?' tablosunu da inceleyin.

İğne bebeğinize ne zaman yapılır?

Ekim ile Mart ayları arasında doğan bebeklere iğne, doğumdan sonraki 2 hafta içinde yapılır.

Eki	Kas
Ara	Oca
Şub	Mar



Randevu?

Randevu için sağlık ocağı (consultatiebureau) sizinle iletişime geçecektir.

Nisan ile Eylül ayları arasında doğan bebeklere iğne Eylül veya Ekim ayında yapılır.

Nis	May
Haz	Tem
Ağu	Eyl



Randevu?

Randevuya dair bilgiler içeren bir mektup alacaksınız.

Published by:

**National Institute for Public Health
and the Environment, RIVM**

P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven

The Netherlands

www.rivm.nl/en

June 2025

Committed to health and sustainability