



National Institute for Public Health
and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport

Protégez votre bébé contre le VRS

Programme national de vaccination



Protection contre le VRS

Les nourrissons nés à partir du 1er avril 2025 peuvent recevoir une injection contre le VRS. Cette injection protège votre nourrisson de maladies graves que le virus RS peut entraîner. L'injection est faite dans la cuisse.



Chaque année, 1 500 à 3 000 nourrissons sont hospitalisés à cause du VRS.

Le VRS

Le VRS provoque des infections des voies respiratoires. Les nourrissons peuvent en être très malades. Ils peuvent par exemple avoir du mal à respirer ou développer une pneumonie. Plus le nourrisson est jeune, plus il est susceptible de tomber gravement malade à cause du VRS.

Une bonne protection

L'injection d'anticorps contre le VRS offre une protection rapide et efficace. Dans certains pays d'Europe, les nourrissons peuvent déjà recevoir l'injection d'anticorps, notamment en Belgique et en France. Daar komen 80% minder kinderen door het RS-virus in het ziekenhuis terecht.

Effets secondaires ?

L'injection n'engendre pratiquement jamais d'effets secondaires chez les nourrissons. Occasionnellement, le point d'injection peut rester brièvement un peu rouge ou gonflé ou le nourrisson peut développer une éruption cutanée.

Comment fonctionne l'injection ?

L'injection contre le VRS n'est pas une vaccination, mais une injection d'anticorps. Le fonctionnement est donc différent. Dans le cas d'une vaccination, le corps doit produire lui-même les anticorps, ce qui peut entraîner des effets secondaires. Dans le cas d'une injection contenant des anticorps, le corps n'a pas besoin de les fabriquer lui-même. C'est pourquoi il n'y a presque jamais d'effets secondaires.

Une protection au bon moment

L'injection protège votre nourrisson pendant six mois environ. Le VRS se manifeste principalement en automne et en hiver. C'est donc la saison de naissance de votre nourrisson qui détermine le moment où il se verra proposer l'injection. Ainsi, votre nourrisson est protégé à la bonne saison.

À quelle fréquence ?

Votre nourrisson ne reçoit l'injection qu'une seule fois pendant sa première année de vie.

Le plus rapidement possible

Les tout jeunes nourrissons sont les plus vulnérables aux graves maladies provoquées par le VRS. C'est pourquoi les nourrissons nés en automne et en hiver reçoivent l'injection le plus rapidement possible. De cette manière, votre nourrisson est protégé au moment où le VRS se manifeste le plus souvent. Vous pouvez aussi consulter le calendrier « Quand votre nourrisson recevra-t-il l'injection ? ».

Quand votre nourrisson recevra-t-il l'injection ?


Les nourrissons nés d'octobre à mars reçoivent l'injection dans les 2 semaines qui suivent la naissance.



Rendez-vous ?

Le centre de santé pour la petite enfance [consultatiebureau] vous contactera pour fixer un rendez-vous.

Les bébés nés d'avril à septembre reçoivent l'injection en septembre ou en octobre.



Rendez-vous ?

Vous recevrez un courrier contenant des informations sur le rendez-vous.

Published by:

**National Institute for Public Health
and the Environment, RIVM**

P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven

The Netherlands

www.rivm.nl/en

June 2025

Committed to health and sustainability