



National Institute for Public Health
and the Environment
Ministry of Health, Welfare and Sport

Protege a tu bebé del virus respiratorio sincitial

Programa Nacional de Vacunación



Protección contra el virus RS

Los bebés nacidos a partir del 1 de abril de 2025 pueden recibir la inyección contra el virus respiratorio sincitial (RS). Esta inyección protege al bebé de enfermedades graves causadas por el virus RS. La inyección se administra a los bebés en la parte superior de la pierna.



Cada año, entre 1500 y 3000 bebés son hospitalizados a causa del virus RS.

Virus RS

El virus RS provoca una infección en las vías respiratorias. Los bebés pueden enfermar gravemente. Por ejemplo, pueden tener problemas para respirar o contraer neumonía. Cuanto más pequeño es el bebé, más probabilidades tiene de enfermar gravemente por el virus RS.

Buena protección

La inyección contra el virus RS protege bien y rápidamente. Algunos países europeos, como Bélgica y Francia, ya administran esta inyección a los bebés. En estos países, el porcentaje de niños hospitalizados a causa del virus RS se reduce en un 80 %.

¿Efectos secundarios?

Los bebés casi nunca sufren efectos secundarios de la vacuna. Muy raramente, la zona de punción se puede enrojecer o hinchar durante un breve periodo de tiempo, o los bebés pueden desarrollar una erupción cutánea.

¿Cómo funciona la inyección?

La inyección contra el virus RS no es una vacuna, sino una inyección con anticuerpos. Esta inyección funciona de una manera diferente a una vacuna. Al administrar una vacuna, el cuerpo tiene que fabricar sus propios anticuerpos. Esto puede causar efectos secundarios. Con una inyección que ya contiene los anticuerpos, el cuerpo no tiene que fabricarlos por sí mismo. Por ese motivo, casi nunca hay efectos secundarios.

Protección en la estación adecuada

La vacuna protege durante aproximadamente seis meses. El virus RS es más frecuente en otoño e invierno. Por lo tanto, la estación del año en la que nace el bebé determina cuándo se le administra la inyección. De esta manera, tu bebé estará protegido en la estación adecuada.

¿Con qué frecuencia?

Tu bebé recibirá la vacuna 1 sola vez durante su primer año de vida.

Lo antes posible

Los bebés más pequeños son los más vulnerables a las enfermedades graves provocadas por el virus RS. Por ese motivo, los bebés nacidos en otoño e invierno reciben la vacuna lo antes posible después de nacer. Así, tu bebé estará protegido en el momento en el que el virus RS es más prevalente. Consulta también el calendario «¿Cuándo se le administra la inyección al bebé?».

¿Cuándo se le administra la inyección al bebé?

Los bebés nacidos de octubre a marzo reciben la inyección en las 2 semanas siguientes al nacimiento.

oct	nov
dic	ene
feb	mar



Los bebés nacidos entre abril y septiembre se vacunan en septiembre u octubre.

abr	may
jun	jul
ago	sep



¿Se necesita una cita?

El centro de salud se pondrá en contacto contigo para concertar una cita.

¿Se necesita una cita?

Recibirás una carta con información sobre la cita.

Published by:

**National Institute for Public Health
and the Environment, RIVM**

P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven

The Netherlands

www.rivm.nl/en

June 2025

Committed to health and sustainability