




Wat is de DKT-prik?

De DKT-prik beschermt je kind tegen 3 ernstige ziektes: difterie, kinkhoest en tetanus.

Wat is difterie?



Difterie veroorzaakt schade aan de longen, het hart en de nieren.



Kinderen met difterie kunnen erg benauwd worden.



Difterie is erg besmettelijk. Het kan zich heel snel verspreiden naar andere mensen.



Voordat de prik er was, overleden veel kinderen aan difterie.

Wat is kinkhoest?



Kinkhoest veroorzaakt hoestbuien die maanden kunnen duren.



Dit kan leiden tot benauwdheid of longontsteking.



Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor baby's. Oudere kinderen kunnen baby's besmetten.



Soms overlijden baby's aan kinkhoest.

Wat is tetanus?



Tetanus veroorzaakt ernstige kramp in spieren, zoals de kaakspier.



Als ademhalingspijnen verkrampen, krijgen kinderen problemen met slikken en ademen.



Je kunt tetanus krijgen als je wordt gebeten door een huisdier.



Of als er straatvuil in een open wondje komt.

Welke bijwerkingen kan je kind krijgen van de DKT-prik?



Koorts



Pijn op de prikplek



Hoofdpijn



Misselijkheid of overgeven

Deze bijwerkingen duren meestal niet langer dan 2 tot 3 dagen.

Op welke leeftijd?

Als kinderen **5 jaar** zijn krijgen ze een DKT-prik. Ook in het eerste levensjaar krijgen kinderen prikken tegen difterie, kinkhoest en tetanus.



Sinds:

1957

zitten vaccinaties tegen difterie, kinkhoest en tetanus in het Rijksvaccinatieprogramma.

Heb je vragen?

Kijk op rijksvaccinatieprogramma.nl of stel je vraag bij de jeugdgezondheidszorg/GGD.

