













Quels vaccins mon enfant reçoit-il ?

<p>Injection contre le VRS</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 à 2 semaines pour les nourrissons nés d'avril à mars 0 à 7 mois pour les nourrissons nés d'avril à septembre 	<p>De 6 à 9 semaines</p> <ul style="list-style-type: none"> Rota (DTCP-Hib-HepB)* 	<p>3 mois</p> <ul style="list-style-type: none"> Rota DTCP-Hib-HepB Pneu 	<p>5 mois</p> <ul style="list-style-type: none"> DTCP-Hib-HepB Pneu 																												
<p>Signification des abréviations</p> <table border="0"> <tr><td>RS</td><td>Le VRS</td></tr> <tr><td>Rota</td><td>Rotavirus</td></tr> <tr><td>D</td><td>Diphtérie</td></tr> <tr><td>C</td><td>Coqueluche</td></tr> <tr><td>T</td><td>Tétanos</td></tr> <tr><td>P</td><td>Poliomyélite</td></tr> <tr><td>Hib</td><td>Haemophilus influenzae de type b</td></tr> <tr><td>HepB</td><td>Hépatite B</td></tr> <tr><td>Pneu</td><td>Pneumocoque</td></tr> <tr><td>O</td><td>Oreillons</td></tr> <tr><td>R</td><td>Rougeole</td></tr> <tr><td>R</td><td>Rubéole</td></tr> <tr><td>MenACWY</td><td>Méningocoque ACWY</td></tr> <tr><td>HPV</td><td>Papillomavirus humain</td></tr> </table> <p><i>Des questions ? Posez-les au centre de santé pour la petite enfance [consultatiebureau] ou consultez le site rijksvaccinatieprogramma.nl</i></p>	RS	Le VRS	Rota	Rotavirus	D	Diphtérie	C	Coqueluche	T	Tétanos	P	Poliomyélite	Hib	Haemophilus influenzae de type b	HepB	Hépatite B	Pneu	Pneumocoque	O	Oreillons	R	Rougeole	R	Rubéole	MenACWY	Méningocoque ACWY	HPV	Papillomavirus humain	<p>12 mois</p> <ul style="list-style-type: none"> DTCP-Hib-HepB Pneu 	<p>14 mois</p> <ul style="list-style-type: none"> ROR MenACWY 	<p>3 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> ROR 
	RS	Le VRS																													
	Rota	Rotavirus																													
D	Diphtérie																														
C	Coqueluche																														
T	Tétanos																														
P	Poliomyélite																														
Hib	Haemophilus influenzae de type b																														
HepB	Hépatite B																														
Pneu	Pneumocoque																														
O	Oreillons																														
R	Rougeole																														
R	Rubéole																														
MenACWY	Méningocoque ACWY																														
HPV	Papillomavirus humain																														
<p>5 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> DCT 	<p>10 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> HPV Rappel 6 mois après la première injection 	<p>14 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> DTP MenACWY 																													

* Uniquement si la mère n'a pas été vaccinée contre la coqueluche durant sa grossesse (injection contre la coqueluche) et dans les situations particulières. En concertation avec le pédiatre.