



Какие прививки получит мой ребенок?

Прививка от респираторно-синцитиального вируса (РСВ)

- от 0 до 2 недель для детей, родившихся с октября по март
- от 0 до 7 месяцев для детей, родившихся с апреля по сентябрь

6–9 недель

- Рота
- (ДКТП–ХИБ–ГепВ)*




3 месяца

- Рота
- ДКТП–ХИБ–ГепВ
- Пневмококки



5 месяцев

- ДКТП–ХИБ–ГепВ
- Пневмококки



Значение сокращений

РСВ	Респираторно-синцитиальный вирус
Рота	Ротавирус
Д	Дифтерия
К	Коклюш
Т	Тетанус
П	Полиомиелит
Хиб	Гемофильная инфекция типа б
ГепВ	гепатит В
Пневмококк	Пневмококковая инфекция
П	Паротит
К	Корь
К	Краснуха
МенАСWY	Менингококковая инфекция типа А, С, W и Y
ВПЧ	вирус папилломы человека

Вопросы? Задайте их в детском консультационном бюро или зайдите на сайт rijksvaccinatieprogramma.nl

12 месяцев

- ДКТП–ХИБ–ГепВ
- Пневмококки



14 месяцев

- КПК
- МенАСWY



3 года

- КПК



5 лет

- ДКТ



10 лет

- ВПЧ
- 2-ая прививка через полгода



14 лет

- ДТП
- МенАСWY



* Только в том случае, если мать не была привита от коклюша во время беременности (прививка от коклюша).
А также в особых ситуациях. Педиатр с вами это обсудит.