



# ¿Qué vacunas recibirá mi hijo/a?

<p><b>Inyección contra el virus RS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De 0 a 2 semanas para los bebés nacidos de octubre a marzo</li> <li>De 0 a 7 meses para los bebés nacidos de abril a septiembre</li> </ul> 	<p><b>6-9 semanas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rota</li> <li>(DTTP-Hib-HepB)*</li> </ul> 	<p><b>3 meses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rota</li> <li>DTTP-Hib-HepB</li> <li>Neumococo</li> </ul> 	<p><b>5 meses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DTTP-Hib-HepB</li> <li>Neumococo</li> </ul> 																												
<p><b>Significado de las abreviaturas</b></p> <table border="0"> <tr><td><b>RS</b></td><td>Virus RS</td></tr> <tr><td><b>Rota</b></td><td>Rotavirus</td></tr> <tr><td><b>D</b></td><td>Difteria</td></tr> <tr><td><b>T</b></td><td>Tos ferina</td></tr> <tr><td><b>T</b></td><td>Tétanos</td></tr> <tr><td><b>P</b></td><td>Poliomielitis</td></tr> <tr><td><b>Hib</b></td><td>Haemophilus influenzae tipo b</td></tr> <tr><td><b>HepB</b></td><td>Hepatitis B</td></tr> <tr><td><b>Neumococo</b></td><td>Neumococo o Streptococcus pneumoniae</td></tr> <tr><td><b>S</b></td><td>Sarampión</td></tr> <tr><td><b>P</b></td><td>Paperas</td></tr> <tr><td><b>R</b></td><td>Rubéola</td></tr> <tr><td><b>MenACWY</b></td><td>Meningococo tipos A, C, W e Y</td></tr> <tr><td><b>VPH</b></td><td>Virus del papiloma humano</td></tr> </table> <p>¿Alguna pregunta? Pregunta en el consultorio o consulta el sitio <a href="http://rijksvaccinatieprogramma.nl">rijksvaccinatieprogramma.nl</a></p>	<b>RS</b>	Virus RS	<b>Rota</b>	Rotavirus	<b>D</b>	Difteria	<b>T</b>	Tos ferina	<b>T</b>	Tétanos	<b>P</b>	Poliomielitis	<b>Hib</b>	Haemophilus influenzae tipo b	<b>HepB</b>	Hepatitis B	<b>Neumococo</b>	Neumococo o Streptococcus pneumoniae	<b>S</b>	Sarampión	<b>P</b>	Paperas	<b>R</b>	Rubéola	<b>MenACWY</b>	Meningococo tipos A, C, W e Y	<b>VPH</b>	Virus del papiloma humano	<p><b>12 meses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DTTP-Hib-HepB</li> <li>Neumococo</li> </ul> 	<p><b>14 meses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPR</li> <li>MenACWY</li> </ul> 	<p><b>3 años</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SPR</li> </ul> 
<b>RS</b>	Virus RS																														
<b>Rota</b>	Rotavirus																														
<b>D</b>	Difteria																														
<b>T</b>	Tos ferina																														
<b>T</b>	Tétanos																														
<b>P</b>	Poliomielitis																														
<b>Hib</b>	Haemophilus influenzae tipo b																														
<b>HepB</b>	Hepatitis B																														
<b>Neumococo</b>	Neumococo o Streptococcus pneumoniae																														
<b>S</b>	Sarampión																														
<b>P</b>	Paperas																														
<b>R</b>	Rubéola																														
<b>MenACWY</b>	Meningococo tipos A, C, W e Y																														
<b>VPH</b>	Virus del papiloma humano																														
<p><b>5 años</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DTT</li> </ul> 	<p><b>10 años</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VPH</li> <li>2ª vacunación seis meses después</li> </ul> 	<p><b>14 años</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DTP</li> <li>MenACWY</li> </ul> 																													

\* Solo si la madre no fue vacunada contra la tosferina durante el embarazo (vacuna de la tosferina) y en situaciones especiales. El pediatra lo comentará contigo.