



Çocuğum hangi aşıları olacak?

RS virüsüne karşı aşı

- Ekim'le Mart arasında doğan bebekler doğumdan sonra **0 ile 2 hafta arası**
- Nisan'la Eylül arasında doğan bebekler doğumdan sonra **0 ile 7 ay arası**




6-9 haftalıkken

- Rota
- (DBTP-Hib-HepB)*



3 aylıkken

- Rota
- DBTP-Hib-HepB
- Pnömokok



5 aylıkken

- DBTP-Hib-HepB
- Pnömokok



Kısaltmaların anlamları

RS	RS-virüsü
Rota	Rotavirüs
D	Difteri
B	Boğmaca
T	Tetanoz
P	Polio/çocuk felci
Hib	Hemofilus influenza tip B
HepB	Hepatit B
K	Kabakulak
K	Kızamık
K	Kızamıkçık
MenACWY	Meningokok ACWY
HPV	Human Papilloma Virüs

Sorularınız mı var? Sorularınızı sağlık ocağındaki çocuk izlem merkezine (consultatiebureau) sorun veya rijksvaccinatieprogramma.nl adresine bakın.


12 aylıkken

- DBTP-Hib-HepB
- Pnömokok



14 aylıkken

- KKK
- MenACWY



3 yaşında

- KKK



5 yaşında

- DBT



10 yaşında

- HPV
- 2. doz 6 ay sonra



14 yaşında

- DTP
- MenACWY



* Sadece eğer anne gebelik sırasında boğmaca karşı aşı (boğmaca aşısı) olmamış ise yapılır. Ve bazı özel durumlarda. Çocuk doktorunuz sizinle bu konuyu konuşacaktır.