Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
*Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport*

Beslisboom voor inhaalschema's Rijksvaccinatieprogramma 2026

Baby's

Leeftijd nu | **Leeftijd 1e vaccinaties** | **Vaccinatieschema**

Als er al (deel)vaccinaties gegeven zijn, laat je die weg als dat kan.

Tot half jaar → **Geen vaccinaties gehad of voor de leeftijd van half jaar begonnen**

Standaardschema 1a. Zuigelingen (na Mat-DKT)

1e vaccinatie vanaf 6-9 wk : Rota1
2e vaccinaties vanaf 3 mnd : DKTP-Hib-HepB1 + Pneu1 + Rota2
3e vaccinaties 2 mnd na 2e : DKTP-Hib-HepB2 + Pneu2
4e vaccinaties 7 mnd na 3e : DKTP-Hib-HepB3 + Pneu3
14 maanden oud : BMR1 + MenACWY
AZC-kinderen 9 maanden : BMR0

- Rota heeft max leeftijd van 23 wkn6dgn. Als Rota1 tussen 20wkn en 23 wkn6dgn wordt toegediend vervalt Rota2.
- RSV-immunisatie eenmalig vlak vóór of tijdens het RSV-seizoen, tot de leeftijd van 1 jaar.
- Overige en vervolgvaccinaties conform het normale schema. Let op de minimale intervallen.

Aangepast schema 1b. Zuigelingen

1e vaccinaties vanaf 6-9 wk : DKTP-Hib-HepBX + Rota1
2e vaccinaties 1 mnd na 1e : DKTP-Hib-HepB1 + Pneu1 + Rota2
3e vaccinaties 2 mnd na 2e : DKTP-Hib-HepB2 + Pneu2
4e vaccinaties 7 mnd na 3e : DKTP-Hib-HepB3 + Pneu3
14 maanden oud : BMR1 + MenACWY
AZC-kinderen 9 maanden : BMR0

- Rota heeft max leeftijd van 23 wkn6dgn. Als Rota1 tussen 20wkn en 23 wkn6dgn wordt toegediend vervalt Rota2.
- RSV-immunisatie eenmalig vlak vóór of tijdens het RSV-seizoen, tot de leeftijd van 1 jaar.
- Overige en vervolgvaccinaties conform het normale schema. Let op de minimale intervallen.

Half jaar tot 1e verjaardag → **Geen vaccinaties gehad of na leeftijd van half jaar begonnen**

Schema 2. Alle zuigelingen met start in 2e helft 1e levensjaar

1e vaccinaties vanaf 6 mnd : DKTP-Hib-HepB1 + Pneu1
2e vaccinaties 2 mnd na 1e : DKTP-Hib-HepB2 +Pneu2
3e vaccinaties 7 mnd na 2e : DKTP-Hib-HepB3 + Pneu3
14 maanden oud : BMR1 + MenACWY
AZC-kinderen 9 maanden : BMR0

- RSV-immunisatie eenmalig vlak vóór of tijdens het RSV-seizoen, tot de leeftijd van 1 jaar.
- Overige en vervolgvaccinaties conform het normale schema. Let op de minimale intervallen.

Half jaar tot 1e verjaardag → **Voor leeftijd van half jaar begonnen**

Zie schema 1a of 1b.
Voor Rota is er geen indicatie meer, kind is inmiddels te oud.

Kinderen 1 tot 2 jaar

Leeftijd nu | **Leeftijd 1e vaccinaties** | **Vaccinatieschema**

1e tot 2e verjaardag

Geen vaccinaties gehad of na 1e verjaardag begonnen

Schema 3. Start vanaf 1e tot 2e verjaardag

1e vaccinaties	: DKTP-Hib-HepB1 + Pneu1
2e vaccinaties 1 mnd na 1e	: BMR1 + MenACWY
3e vaccinaties 2 mnd na 1e	: DKTP(-Hib)-HepB2 + Pneu2
4e vaccinaties 7 mnd na 3e	: DKTP(-Hib)-HepB3

Overige en vervolgvaccinaties conform het normale schema. Let hierbij op de juiste planning voor vaccinaties in een serie, rekening houdend met de minimale intervallen.

Voor 1e verjaardag begonnen

Zie schema 1a, 1b of 2 + onderstaande opmerkingen
Hib: 1x Hib na 1e verjaardag is voldoende, maar wordt als onderdeel van Vaxelis toegediend.
Pneu: als er 1 vaccinatie voor de 1e verjaardag is gegeven of als de 1e vaccinatie na de 1e verjaardag valt, zijn 2 vaccinaties na de 1e verjaardag voldoende met een interval van 2 maanden.
Als het kind vanaf 3 mnd DKTP(-Hib)-HepB1 heeft gehad, kan nu een 0-2-9 schema worden gevolgd, ook zonder Mat-DKT.

Kinderen 2-18 jaar

Leeftijd nu

Leeftijd 1e vaccinaties

Vaccinatieschema

Peuter-MenACWY in RVP voor cohort 2019 en jonger: *inplannen indien het kind geen MenACWY na de 1e verjaardag heeft gehad.*
Peuter-MenACWY voor cohort 2018 en ouder: *inplannen indien het kind geen MenACWY of MenC na de 1e verjaardag heeft gehad.*
BMR2: *individueel toedienen of tijdens de groepssessie voor de inhaalcohorten. In 2025 zijn dat cohorten 2016 en 2017.*
Tiener-MenACWY: *indien tieners op of na de 11e verjaardag een MenACWY hebben gehad, dan ontvangen ze er geen meer vanuit het RVP.*

2e tot 18e verjaardag

Geen vaccinaties gehad of na 2e verjaardag begonnen

Schema 4. Start vanaf 2e tot 18e verjaardag

1e vaccinaties : DKTP(-Hib)-HepB1 + BMR1
2e vaccinaties 2 mnd na 1e : DKTP(-Hib)-HepB2 + MenACWY
3e vaccinaties 7 mnd na 2e : DKTP(-Hib)-HepB3

Hib: hoeft niet na 2e verjaardag gegeven te worden, maar wordt als onderdeel van Vaxelis toegediend.
Pneu: vervalt na 2e verjaardag.
BMR2: tussen 2,5 en 3,5 jaar toedienen volgens het reguliere schema. Op oudere leeftijd zo snel mogelijk.
Minimaal 1 maand na BMR1 toedienen.
DKT-booster: minimaal 4 jaar na de laatste DKTP-Hib-HepB3-vaccinatie.
DTP-booster: minimaal 5 jaar na de DKT(P)-booster, maar niet eerder dan in het jaar waarin het kind 14 wordt.
HPV en tiener-MenACWY: worden in principe tijdens groepsvaccinaties toegediend.

Voor 1e verjaardag begonnen

Zie schema 1a, 1b of 2 + onderstaande opmerkingen. Als het kind vanaf 3 mnd DKTP(-Hib)-HepB1 heeft gehad, kan nu een 0-2-9 schema worden gevolgd, ook zonder Mat-DKT.

Tussen 1e en 2e verjaardag begonnen

Zie schema 3 + onderstaande opmerkingen.

Opmerkingen
Hib: hoeft niet na 2e verjaardag gegeven te worden, maar wordt als onderdeel van Vaxelis toegediend.
Pneu: vervalt na 2e verjaardag.
BMR1: zo snel mogelijk plannen, indien nog niet toegediend.
BMR2: tussen 2,5 en 3,5 jaar toedienen volgens het reguliere schema. Op oudere leeftijd zo snel mogelijk.
Minimaal 1 maand na BMR1 toedienen.
DKT-booster: minimaal 4 jaar na de laatste DKTP-Hib-HepB3-vaccinatie.
DTP-booster: minimaal 5 jaar na de DKT(P)-booster, maar niet eerder dan in het jaar waarin het kind 14 wordt.
HPV en tiener-MenACWY: worden in principe tijdens groepsvaccinaties toegediend.

Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

januari 2026

016609

De zorg voor morgen begint vandaag